

# תצפית נדירה על התלהקות של מאות מחבטנים אפורים

Posted on 4 בינואר 2024 by שוש להב



הטמפרטורה החמה בילבלה את המחבטנים האפורים, שהאריכו את תקופת הרבייה וממשיכים להתרבות גם בחורף, ותועדו בהמוניהם באזור בת גלים בחיפה

**Categories:** מה חדש?, ראשי

**Tag:** מחבטנים האפורים

מראה מפתיע וקסום במעמקי הים: **אורן רוזנר**, מדריך צלילה חופשית ומורה לביולוגיה בתיכון בהרדוף, זכה לתעד התלהקות של מאות מחבטנים אפורים, בגודל של כמטר וחצי, באזור בת גלים בחיפה. "שחינו כ-300 מטר מחוף בת גלים בדרך לאתר הצלילה של הספינה הטורקית. היתה ראות גרועה של 4-8 מ', ובכל זאת ינאי זיהה לפתע מספר מחבטנים קרוב לקרקעית, בעומק של כ-5 מטרים.

צללנו לכיוונם, וזיהינו להקה של עשרות מחבטנים, ואחריה עוד אחת ועוד אחת, וזה פשוט לא נגמר. זאת הייתה חוויה מטורפת. הרוב היו בתנועה מערבה, כאילו מכוונים לאן שהוא, וחלק פשוט שחו סביב עצמם. זו תצפית מאוד יוצאת דופן ונדירה, לכן פנינו לרשות הטבע והגנים לברר מדוע הם עדיין נמצאים כאן."

**ד"ר אורי פריד**, אקולוגית ים ברשות הטבע והגנים, הסבירה: "תקופת הרבייה של המחבטנים האפורים הנה בעונות

האביב והסתיו. אבל בגלל שיבושים כאלה ואחרים שקשורים בטמפרטורת הים, אנחנו מעריכים שייתכן ששינויי האקלים משפיעים על הרבייה, ומחבטנים האריכו את תקופת הרבייה גם בחורף. הנקבות משריצות צאצאים חיים, לאחר שהצאצאים התפתחו בביצה ובקעו בתוך הרחם".

ברשות הטבע והגנים מוסיפים כי המחבטן, כמו רוב הבטאים, מעדיף לשהות קרוב לקרקעית, בדרך כלל באזורים בהם יש שילוב של סלע וחול, לשם מציאת מסתור. החרטום שלו מעוגל וצבע גבו כהה, לעתים עם נקודות. למחבטן האפור יש קוץ על זנבו הקצר יחסית, שעלול לגרום לפציעה. קוטר גופו מגיע לרוב עד למטר, אך לעתים יכול גם להגיע לגודל של מטר וחצי. שוכן בעומק של 10-200 מ', אך לרוב מופיע בעומק הגדול מ-20 מ'.

המחבטן האפור ניזון מדגי גרם ומחסרי חוליות שוכני קרקעית, בעיקר סרטנאים. המחבטן האפור נראה לעתים קרובות ביותר במים חופיים לאורך חופי ישראל, בעיקר בקניון אכזיב שבצפון הארץ. לרוב הוא נראה בחופים הדרומיים והמזרחיים ביותר של הים התיכון.

**מוזמנים גם לבקר בקבוצת הפייסבוק שלנו 'טיול משפחתי בארץ ובעולם**